

**Klinische Profile  
der frührehabilitativen Geriatrie  
auf Basis der G-DRG V1.0  
und GEMIDAS V4.1, Jahrgang 2002**

**Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Klinisch-Geriatriischen Einrichtungen e.V.**

**- Ausschuss Qualitätssicherung I -**

M. Borchelt, D. Poser

Forschungsgruppe Geriatrie am EGZB  
Med. Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin  
Charité – Campus Virchow-Klinikum

Mit freundlicher Unterstützung der  
DRG-Research Group Münster (N. Roeder)

31. März 2003

Version 1.11

## Erläuterungen

Die nachfolgenden klinischen Profile basieren auf der GEMIDAS-Dokumentation von Mitgliedseinrichtungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Klinisch-Geriatriischen Einrichtungen e.V. (BAG). Es wird die GEMIDAS Version 4.1 zugrunde gelegt, die Anfang 2002 aus der Vorgängerversion entwickelt und ab dem 2. Quartal 2002 in insgesamt 17 Krankenhäusern umgesetzt wurde (12 Fachabteilungen, 5 Fachkrankenhäuser für Geriatrie). Das Datensatzformat ist auf dem Web-Server der BAG veröffentlicht ([www.bag-geriatrie.de](http://www.bag-geriatrie.de)).

Die Daten wurden Anfang März 2003 mit dem zertifizierten Grouper GDrGroup V1.0 von VisasysDE gegroupt und anschließend in Microsoft Access 2000 weiter ausgewertet. Den klinischen Profilen wurden die von der DRG-Research Group Münster entwickelten Definitionen und Muster zugrundegelegt, die um ergänzende Statistiken (Verlegungsfälle, Verweildauer nach Altersgruppen) erweitert wurden.

Für jede DRG wird die Gesamtzahl der Kliniken ausgewiesen, die Fälle zur DRG beigesteuert haben sowie die Zahl der Kliniken mit jeweils 10 und mehr Fällen („Kliniken mit  $n > 9$  / ges.“). Es wird zudem die Zahl der Verlegungsfälle angegeben, wobei die Definition nach KFPV zugrunde gelegt wird. Ebenfalls ausgewiesen wird die Zahl der Fälle mit Prozeduren, da das GEMIDAS Format V4.1 unterjährig implementiert wurde und die Ergänzung der Prozeduren eine wesentliche Änderung gegenüber der Vorgängerversion darstellte. Zu jeder DRG sind bestimmte Informationen des FP-Katalogs angegeben (markiert mit „\*“), die den Projektdaten (BAG-Stichprobe) gegenübergestellt werden.

**Diagnosen:** Verdoppelungen von ICD-Codes wurden vor Auswertung auf Fallebene ausgeschlossen. Die Prozentangaben beziehen sich damit jeweils eindeutig auf die Gesamtzahl der Fälle in einer DRG. Es werden jeweils nur die 12 häufigsten Diagnosen mit vollständig differenzierter Kodierung angegeben. Zu jeder Hauptdiagnose wird zusätzlich zur relativen und kumulativen Häufigkeit auch die mittlere Verweildauer (arithmetisch und geometrisch) angegeben. Unter den Nebendiagnosen sind die mit einem Schweregrad bewerteten Kodierungen mit „SG“ gekennzeichnet. Diese werden in einer zusätzlichen Tabelle ergänzend ausgewertet.

**Prozeduren:** Doppelte Prozedurenangaben wurden, wenn nach OPS zulässig, im Datensatz belassen. Da die häufigsten Prozedurenangaben in der Geriatrie (z.B. 8-550, 9-404, 9-301 etc.) ohnehin nur einmal pro Aufenthalt angegeben werden dürfen, wird neben der Häufigkeit bezogen auf alle Prozeduren (Spalte „OPS“) auch die Häufigkeit bezogen auf die Fallzahl der DRG angegeben (Spalte „Fälle“). Relative Häufigkeiten von Prozeduren werden dabei nur in Bezug auf alle Fälle mit einer Prozedurendokumentation angegeben. Oberhalb der Tabelle wird der Anteil der Fälle mit Prozeduren absolut und relativ angegeben. Aus der Kombination kann die Dokumentationsprävalenz einer Prozedur in der gesamten Fallgruppe abgeleitet werden.

### Abkürzungen:

|         |   |
|---------|---|
| geo.    | geometrischer Mittelwert  |
| arith.  | arithmetischer Mittelwert   |
| VD, VWD | Verweildauer  |
| PKKS    | Patientenbezogene klinische Komplexitätsstufe (PCCL)                |
| Geschl. | Geschlecht  |
| RG      | Relativgewicht (Bewertungsrelation)                                 |
| BFP     | Basisfallpreis  |
| Kum.    | Kumulativ   |
| Kat.    | Katalog (FP-Katalog G-DRG V1.0 gemäß KFPV)                          |
| SG      | Schweregradsteigernd (CCL-bewertete Nebendiagnosen)                 |
| GR      | Gruppierungsrelevant (zur Festlegung der DRG verwendete Prozeduren) |

# B70A Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur

Kliniken mit n>9 / ges.: 16 / 17 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 824 82,2% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 1003 Fälle m. Prozeduren: 609 60,7%

|                      |                         |                   |                   |                            |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Katalog* Projekt     | Anzahl Anteil           | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*: 1,936        | Standardfallerlös* 5.599 € |
| VWD geo: 15,0 25,2   | low outlier: 2 0,2%     | 4                 | Abschlag*: 0,381  | Abschlag / Tag*: 1.102 €   |
| VWD arith: 18,0 27,6 | inlier: 638 63,6%       |                   | Zuschlag*: 0,076  | Zuschlag / Tag*: 220 €     |
|                      | high outlier: 363 36,2% | 30                | Verlegung*: 0,119 | Verlegung / Tag*: 344 €    |

| Verlegungsfälle | N   | Anteil | VD      | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle      | Anteil | ari.VD | geo.VD |
|-----------------|-----|--------|---------|------|-------|--------|---------------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|
| Gesamt:         | 824 | 82,2%  |         | 0    | 3     | 0,3%   | M             | 385    | 38,4%      | <11 Jahre: |        |        |        |
| Abschlag:       | 118 | 14,3%  | 1 - 14  | 1    |       |        | W             | 618    | 61,6%      | 11-30 Jahr |        |        |        |
| Pauschale:      | 376 | 45,6%  | 15 - 29 | 2    | 52    | 5,2%   |               |        | 31-50 Jahr | 4          | 0,4%   | 51,0   | 42,5   |
| Zuschlag:       | 330 | 40,0%  | ab 30   | 3    | 241   | 24,0%  |               |        | 51-65 Jahr | 76         | 7,6%   | 29,0   | 24,0   |
|                 |     |        |         | 4    | 707   | 70,5%  |               |        | 66-70 Jahr | 89         | 8,9%   | 29,9   | 25,7   |
|                 |     |        |         |      |       |        |               |        | 71-75 Jahr | 150        | 15,0%  | 28,2   | 24,8   |
|                 |     |        |         |      |       |        |               |        | 76-80 Jahr | 223        | 22,2%  | 29,2   | 26,6   |
|                 |     |        |         |      |       |        |               |        | 81-90 Jahr | 403        | 40,2%  | 26,1   | 23,4   |
|                 |     |        |         |      |       |        |               |        | >90 Jahre: | 58         | 5,8%   | 23,1   | 20,5   |

## Hauptdiagnose (Top 12)

| ICD   | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose  |
|-------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|--|
| I63.5 | 371   | 37,0 | 37,0        | 20,1  | 27,8       | 24,6     | 3,7        | Hirinfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose intrakraniell                |
| I63.4 | 127   | 12,7 | 49,7        | 11,3  | 28,0       | 24,8     | 3,7        | Hirinfarkt durch Embolie intrakranieller Arterien  |
| I64   | 111   | 11,1 | 60,7        | 22,7  | 25,3       | 22,1     | 3,6        | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet  |
| I63.9 | 95    | 9,5  | 70,2        | 6,7   | 26,6       | 23,9     | 3,6        | Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet   |
| I63.3 | 83    | 8,3  | 78,5        | 9,9   | 28,7       | 26,1     | 3,5        | Hirinfarkt durch Thrombose intrakranieller Arterien  |
| I63.2 | 48    | 4,8  | 83,3        | 1,3   | 30,1       | 26,7     | 3,7        | Hirinfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose der extrakraniellen Arterien |
| I63.8 | 25    | 2,5  | 85,7        | 8,1   | 23,1       | 21,0     | 3,6        | Sonstiger Hirinfarkt   |
| I61.3 | 17    | 1,7  | 87,4        | 1,2   | 31,4       | 28,7     | 3,6        | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm  |
| I67.8 | 14    | 1,4  | 88,8        | 4,6   | 27,0       | 23,2     | 3,6        | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten  |
| I61.2 | 13    | 1,3  | 90,1        | 1,1   | 33,8       | 31,9     | 3,5        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                       |
| I61.9 | 12    | 1,2  | 91,3        | 1,3   | 25,6       | 22,5     | 3,6        | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet   |
| I61.0 | 12    | 1,2  | 92,5        | 1,9   | 29,8       | 27,0     | 3,4        | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                                  |

## Nebendiagnose (Top 12)

| ICD    | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 526   | 52,4         | 5,9 |
| R47.0  | SG Dysphasia und Aphasie  | 434   | 43,3         | 4,9 |
| G81.0  | Schlaffe Hemiplegie   | 424   | 42,3         | 4,8 |
| R32    | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz  | 381   | 38,0         | 4,3 |
| I48    | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern  | 320   | 31,9         | 3,6 |
| N39.0  | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet   | 285   | 28,4         | 3,2 |
| R15    | SG Stuhlinkontinenz   | 261   | 26,0         | 2,9 |
| R13    | Dysphagie   | 248   | 24,7         | 2,8 |
| I11.0  | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz  | 158   | 15,8         | 1,8 |
| R47.1  | SG Dysarthrie und Anarthrie   | 154   | 15,4         | 1,7 |
| E11.90 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes] ohne Komplikationen: Nicht als entglei | 144   | 14,4         | 1,6 |
| G81.9  | SG Hemiplegie, nicht näher bezeichnet   | 139   | 13,9         | 1,6 |

## SG-Nebendiagnose (Top 12)

| ICD   | SG-Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | SG   |
|-------|--|-------|--------------|------|
| R47.0 | SG Dysphasia und Aphasie   | 434   | 43,3         | 10,2 |
| R32   | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                       | 381   | 38,0         | 9,0  |
| I48   | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern                             | 320   | 31,9         | 7,6  |
| N39.0 | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet        | 285   | 28,4         | 6,7  |
| R15   | SG Stuhlinkontinenz  | 261   | 26,0         | 6,2  |
| I11.0 | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | 158   | 15,8         | 3,7  |
| R47.1 | SG Dysarthrie und Anarthrie                                      | 154   | 15,4         | 3,6  |
| G81.9 | SG Hemiplegie, nicht näher bezeichnet                            | 139   | 13,9         | 3,3  |
| I50.9 | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                      | 118   | 11,8         | 2,8  |
| F03   | SG Nicht näher bezeichnete Demenz                                | 87    | 8,7          | 2,1  |
| I65.2 | SG Verschluss und Stenose der A. carotis                         | 76    | 7,6          | 1,8  |
| I69.3 | SG Folgen eines Hirninfarktes                                    | 75    | 7,5          | 1,8  |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

# B70A Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur

(Fortsetzung)

## Alle Prozeduren (Top 10)

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 609 60,7%

| OPS     | Prozedur   | Fälle | Anteil |      |
|---------|--|-------|--------|------|
|         |  |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  | 495   | 81,3   | 30,6 |
| 9-301   | Therapeutische Maßnahmen für Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen                               | 291   | 47,8   | 18,0 |
| 9-404   | Neuropsychologische Therapie   | 148   | 24,3   | 9,1  |
| 9-302   | Therapeutische Maßnahmen für Schluckstörungen  | 143   | 23,5   | 8,8  |
| 3-200   | Native Computertomographie des Schädels  | 99    | 16,3   | 6,1  |
| 8-390   | Lagerungsbehandlung  | 93    | 15,3   | 5,7  |
| 8-930   | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zen | 32    | 5,3    | 2,0  |
| 1-632   | <b>GR</b> Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  | 29    | 4,8    | 1,8  |
| 9-405.0 | Psychotherapie: Einzeltherapie   | 26    | 4,3    | 1,6  |
| 3-220   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  | 19    | 3,1    | 1,2  |

## Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)

| OPS     | Fälle     | Anteil |      | VWD    |      | PKKS   |     | Gruppierungsrelevante Prozedur   |
|---------|-----------|--------|------|--------|------|--------|-----|--|
|         |           | Fälle  | kum. | arith. | geo. | arith. |     |  |
| 1-632   | <b>GR</b> | 29     | 37,2 | 82,1   | 33,7 | 31,2   | 3,6 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie                                |
| 5-431.2 | <b>GR</b> | 16     | 20,5 | 87,0   | 36,9 | 35,3   | 3,6 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG)                                |
| 8-015.0 | <b>GR</b> | 11     | 14,1 | 87,6   | 30,5 | 25,1   | 3,9 | Enterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung: Über eine Sonde     |
| 8-015.1 | <b>GR</b> | 3      | 3,8  | 94,9   | 41,7 | 39,9   | 3,7 | Enterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung: Über ein Stoma      |
| 1-440.1 | <b>GR</b> | 3      | 3,8  | 95,3   | 32,3 | 31,9   | 3,0 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankre |
| 5-431.0 | <b>GR</b> | 2      | 2,6  | 95,6   | 23,5 | 22,8   | 3,0 | Gastrostomie: Offen chirurgisch  |
| 8-015.x | <b>GR</b> | 2      | 2,6  | 95,7   | 29,5 | 29,4   | 4,0 | Enterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung: Sonstige            |
| 1-633   | <b>GR</b> | 2      | 2,6  | 96,1   | 32,0 | 32,0   | 4,0 | Diagnostische Gastroskopie   |
| 8-123.0 | <b>GR</b> | 2      | 2,6  | 96,6   | 33,0 | 33,0   | 4,0 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel              |
| 1-650.0 | <b>GR</b> | 2      | 2,6  | 96,7   | 41,0 | 39,5   | 3,5 | Diagnostische Koloskopie: Partiell                                       |
| 1-440.0 | <b>GR</b> | 1      | 1,3  | 98,4   | 35,0 | 35,0   | 4,0 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankre |
| 1-444.6 | <b>GR</b> | 1      | 1,3  | 98,7   | 42,0 | 42,0   | 3,0 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie          |

# G60A Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC

Kliniken mit n>9 / ges.: 5 / 16 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 96 89,7% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 107 Fälle m. Prozeduren: 45 42,1%

|            |          |               |          |                   |             |       |                    |         |
|------------|----------|---------------|----------|-------------------|-------------|-------|--------------------|---------|
| Katalog*   | Projekt  | Anzahl        | Anteil   | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*:        | 0,765 | Standardfallerlös* | 2.212 € |
| VWD geo:   | 4,0 17,3 | low outlier:  | 2 1,9%   | 1                 | Abschlag*:  | 0,363 | Abschlag / Tag*:   | 1.050 € |
| VWD arith: | 7,0 20,3 | inlier:       | 42 39,3% |                   | Zuschlag*:  | 0,108 | Zuschlag / Tag*:   | 312 €   |
|            |          | high outlier: | 63 58,9% | 19                | Verlegung*: | 0,144 | Verlegung / Tag*:  | 416 €   |

| Verlegungsfälle | N  | Anteil | VD     | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. | Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle | Anteil | ari.VD | geo.VD |
|-----------------|----|--------|--------|------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|--------|--------|
| Gesamt:         | 96 | 89,7%  |        | 0    |       |        | M       | 32    | 29,9%  | <11 Jahre: |       |        |        |        |
| Abschlag:       | 3  | 3,1%   | 1 - 3  | 1    |       |        | W       | 75    | 70,1%  | 11-30 Jahr |       |        |        |        |
| Pauschale:      | 34 | 35,4%  | 4 - 18 | 2    |       |        |         |       |        | 31-50 Jahr | 2     | 1,9%   | 18,5   | 18,3   |
| Zuschlag:       | 59 | 61,5%  | ab 19  | 3    | 28    | 26,2%  |         |       |        | 51-65 Jahr | 4     | 3,7%   | 22,0   | 22,0   |
|                 |    |        |        | 4    | 79    | 73,8%  |         |       |        | 66-70 Jahr | 2     | 1,9%   | 23,5   | 23,2   |
|                 |    |        |        |      |       |        |         |       |        | 71-75 Jahr | 16    | 15,0%  | 18,1   | 14,1   |
|                 |    |        |        |      |       |        |         |       |        | 76-80 Jahr | 25    | 23,4%  | 21,6   | 19,9   |
|                 |    |        |        |      |       |        |         |       |        | 81-90 Jahr | 53    | 49,5%  | 20,1   | 16,7   |
|                 |    |        |        |      |       |        |         |       |        | >90 Jahre: | 5     | 4,7%   | 20,2   | 17,5   |

## Hauptdiagnose (Top 12)

| ICD   | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose   |
|-------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|---|
| C20   | 25    | 23,4 | 23,4        | 27,6  | 22,2       | 18,3     | 3,7        | Bösartige Neubildung des Rektums  |
| C18.7 | 18    | 16,8 | 40,2        | 9,4   | 20,6       | 18,1     | 3,8        | Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                  |
| C18.0 | 11    | 10,3 | 50,5        | 2,9   | 15,3       | 13,6     | 3,8        | Bösartige Neubildung: Zäkum   |
| C18.2 | 9     | 8,4  | 58,9        | 3,0   | 19,9       | 19,4     | 3,7        | Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                   |
| C18.9 | 8     | 7,5  | 66,4        | 9,8   | 20,4       | 15,9     | 3,8        | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                     |
| C16.9 | 6     | 5,6  | 72,0        | 9,0   | 22,5       | 15,3     | 3,7        | Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                     |
| C19   | 6     | 5,6  | 77,6        | 1,8   | 20,5       | 20,1     | 3,5        | Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                          |
| C16.2 | 3     | 2,8  | 80,4        | k.A.  | 25,7       | 24,8     | 4,0        | Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                 |
| C18.6 | 2     | 1,9  | 82,2        | 1,4   | 26,0       | 25,0     | 3,0        | Bösartige Neubildung: Colon descendens                                  |
| C18.5 | 2     | 1,9  | 84,1        | k.A.  | 31,5       | 28,5     | 3,5        | Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                  |
| C78.6 | 2     | 1,9  | 86,0        | 6,0   | 21,5       | 21,4     | 4,0        | Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C18.4 | 2     | 1,9  | 87,9        | 3,0   | 11,5       | 8,7      | 3,5        | Bösartige Neubildung: Colon transversum                                 |

## Nebendiagnose (Top 12)

| ICD    | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 47    | 43,9         | 5,5 |
| I50.9  | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                 | 22    | 20,6         | 2,6 |
| N39.0  | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                   | 22    | 20,6         | 2,6 |
| F03    | SG Nicht näher bezeichnete Demenz   | 18    | 16,8         | 2,1 |
| R26.8  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 18    | 16,8         | 2,1 |
| C78.7  | SG Sekundäre bösartige Neubildung der Leber                                 | 17    | 15,9         | 2,0 |
| I48    | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern  | 17    | 15,9         | 2,0 |
| I50.0  | SG Kongestive Herzinsuffizienz  | 15    | 14,0         | 1,7 |
| I11.0  | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz            | 14    | 13,1         | 1,6 |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnetes Gefäß            | 13    | 12,1         | 1,5 |
| H91.1  | Presbyakusis  | 12    | 11,2         | 1,4 |
| R32    | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                                  | 12    | 11,2         | 1,4 |

## SG-Nebendiagnose (Top 12)

| ICD   | SG-Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | SG  |
|-------|--|-------|--------------|-----|
| I50.9 | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                      | 22    | 20,6         | 5,5 |
| N39.0 | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet        | 22    | 20,6         | 5,5 |
| F03   | SG Nicht näher bezeichnete Demenz                                | 18    | 16,8         | 4,5 |
| C78.7 | SG Sekundäre bösartige Neubildung der Leber                      | 17    | 15,9         | 4,3 |
| I48   | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern                             | 17    | 15,9         | 4,3 |
| I50.0 | SG Kongestive Herzinsuffizienz                                   | 15    | 14,0         | 3,8 |
| I11.0 | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | 14    | 13,1         | 3,5 |
| R32   | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                       | 12    | 11,2         | 3,0 |
| D50.0 | SG Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                | 10    | 9,3          | 2,5 |
| R15   | SG Stuhlinkontinenz  | 9     | 8,4          | 2,3 |
| N39.4 | SG Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz                    | 8     | 7,5          | 2,0 |
| N18.8 | SG Sonstige chronische Niereninsuffizienz                        | 8     | 7,5          | 2,0 |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

# G60A Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC

(Fortsetzung)

## Alle Prozeduren (Top 10)

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 45 42,1%

| OPS     | Prozedur   | Fälle | Anteil |      |
|---------|--|-------|--------|------|
|         |  |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  | 40    | 88,9   | 62,5 |
| 9-404   | Neuropsychologische Therapie   | 9     | 20,0   | 14,1 |
| 8-390   | Lagerungsbehandlung  | 3     | 6,7    | 4,7  |
| 8-016   | Parenterale Ernährung als medizinische Hauptbehandlung   | 2     | 4,4    | 3,1  |
| 9-405.3 | Psychotherapie: Krisenintervention   | 2     | 4,4    | 3,1  |
| 3-200   | Native Computertomographie des Schädels  | 2     | 4,4    | 3,1  |
| 8-800.2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzent | 1     | 2,2    | 1,6  |
| 8-153   | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle   | 1     | 2,2    | 1,6  |
| 8-121   | Darmspülung  | 1     | 2,2    | 1,6  |
| 3-225   | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel  | 1     | 2,2    | 1,6  |

## Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)

| OPS | Fälle | Anteil |      | VWD | PKKS | Gruppierungsrelevante Prozedur |
|-----|-------|--------|------|-----|------|--------------------------------|
|     |       | Fälle  | kum. |     |      |                                |
| GR  | 0     |        | 0,0  |     |      |                                |

# I28A Andere Eingriffe am Bindegewebe mit CC

Kliniken mit n>9 / ges.: 4 / 8 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 119 93,7% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 127 Fälle m. Prozeduren: 127 100,0%

|            |         |        |               |                   |       |       |                    |         |
|------------|---------|--------|---------------|-------------------|-------|-------|--------------------|---------|
| Katalog*   | Projekt | Anzahl | Anteil        | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*:  | 1,620 | Standardfallerlös* | 4.685 € |
| VWD geo:   | 11,5    | 25,9   | low outlier:  | 1                 | 0,8%  | 3     | Abschlag*:         | 0,272   |
| VWD arith: | 16,8    | 29,8   | inlier:       | 60                | 47,2% |       | Zuschlag*:         | 0,057   |
|            |         |        | high outlier: | 66                | 52,0% | 27    | Verlegung*:        | 0,087   |
|            |         |        |               |                   |       |       | Verlegung / Tag*:  | 165 €   |
|            |         |        |               |                   |       |       | Verlegung / Tag*:  | 252 €   |

| Verlegungsfälle | N   | Anteil | VD      | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. | Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle | Anteil | ari.VDgeo.VD |
|-----------------|-----|--------|---------|------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|--------------|
| Gesamt:         | 119 | 93,7%  |         | 0    |       |        | M       | 38    | 29,9%  | <11 Jahre: |       |        |              |
| Abschlag:       | 9   | 7,6%   | 1 - 11  | 1    |       |        | W       | 89    | 70,1%  | 11-30 Jahr |       |        |              |
| Pauschale:      | 47  | 39,5%  | 12 - 26 | 2    | 11    | 8,7%   |         |       |        | 31-50 Jahr | 2     | 1,6%   | 46,0 39,8    |
| Zuschlag:       | 63  | 52,9%  | ab 27   | 3    | 18    | 14,2%  |         |       |        | 51-65 Jahr | 19    | 15,0%  | 29,8 23,4    |
|                 |     |        |         | 4    | 98    | 77,2%  |         |       |        | 66-70 Jahr | 6     | 4,7%   | 30,3 27,4    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 71-75 Jahr | 20    | 15,7%  | 27,8 23,2    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 76-80 Jahr | 23    | 18,1%  | 30,8 27,3    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 81-90 Jahr | 42    | 33,1%  | 30,7 28,1    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | >90 Jahre: | 15    | 11,8%  | 26,0 23,1    |

## Hauptdiagnose (Top 12)

| ICD    | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose  |
|--------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|--|
| R26.2  | 21    | 16,5 | 16,5        | k.A.  | 27,8       | 24,1     | 3,7        | Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert                              |
| S72.10 | 17    | 13,4 | 29,9        | 5,7   | 27,4       | 26,0     | 3,6        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet                             |
| S72.00 | 10    | 7,9  | 37,8        | k.A.  | 33,7       | 27,4     | 3,9        | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet                             |
| T87.4  | 5     | 3,9  | 41,7        | k.A.  | 32,6       | 31,2     | 4,0        | Infektion des Amputationsstumpfes  |
| S72.11 | 5     | 3,9  | 45,7        | k.A.  | 27,4       | 26,1     | 4,0        | Femurfraktur: Intertrochantär  |
| S72.01 | 4     | 3,1  | 48,8        | k.A.  | 42,3       | 34,3     | 3,5        | Schenkelhalsfraktur: Intraartikulär [medial]                                 |
| S82.18 | 3     | 2,4  | 51,2        | k.A.  | 31,0       | 30,0     | 3,0        | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                             |
| S72.3  | 3     | 2,4  | 53,5        | k.A.  | 42,7       | 42,3     | 3,7        | Fraktur des Femurschaftes  |
| M62.3  | 3     | 2,4  | 55,9        | k.A.  | 25,0       | 24,8     | 4,0        | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, F |
| Z44.1  | 3     | 2,4  | 58,3        | k.A.  | 30,7       | 25,6     | 3,7        | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Beins (komplett) (partiell)     |
| S72.2  | 2     | 1,6  | 59,8        | 1,6   | 29,5       | 26,7     | 2,5        | Subtrochantäre Fraktur   |
| M48.0  | 2     | 1,6  | 61,4        | k.A.  | 38,0       | 34,5     | 4,0        | Spinalstenose: Lumbalbereich   |

## Nebendiagnose (Top 12)

| ICD    | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 62    | 48,8         | 5,2 |
| L89    | SG Dekubitalgeschwür  | 39    | 30,7         | 3,3 |
| I48    | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern  | 21    | 16,5         | 1,8 |
| R26.8  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 20    | 15,7         | 1,7 |
| N39.0  | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                   | 18    | 14,2         | 1,5 |
| I50.9  | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                 | 16    | 12,6         | 1,4 |
| I25.2  | Alter Myokardinfarkt  | 15    | 11,8         | 1,3 |
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Natürliche Koronararterie                 | 14    | 11,0         | 1,2 |
| R32    | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                                  | 13    | 10,2         | 1,1 |
| H91.1  | Presbyakusis  | 13    | 10,2         | 1,1 |
| R26.2  | Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert                             | 13    | 10,2         | 1,1 |
| R29.81 | Stürze  | 12    | 9,4          | 1,0 |

## SG-Nebendiagnose (Top 12)

| ICD    | SG-Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | SG  |
|--------|--|-------|--------------|-----|
| L89    | SG Dekubitalgeschwür   | 39    | 30,7         | 8,2 |
| I48    | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern                             | 21    | 16,5         | 4,4 |
| N39.0  | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet        | 18    | 14,2         | 3,8 |
| I50.9  | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                      | 16    | 12,6         | 3,4 |
| R32    | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                       | 13    | 10,2         | 2,7 |
| D50.0  | SG Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                | 11    | 8,7          | 2,3 |
| F03    | SG Nicht näher bezeichnete Demenz                                | 10    | 7,9          | 2,1 |
| N18.8  | SG Sonstige chronische Niereninsuffizienz                        | 10    | 7,9          | 2,1 |
| I50.0  | SG Kongestive Herzinsuffizienz                                   | 9     | 7,1          | 1,9 |
| I50.1  | SG Linksherzinsuffizienz   | 8     | 6,3          | 1,7 |
| I11.0  | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | 8     | 6,3          | 1,7 |
| I70.24 | SG Atherosklerose der Extremitätenarterien: Mit Gangrän          | 8     | 6,3          | 1,7 |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

[ 13.03.2003 ]

G-DRG Katalog 1.0 (Erlös simuliert)

(Fortsetzung)

**Alle Prozeduren (Top 10)**

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 127 100,0%

| OPS      | Prozedur   | Fälle | Anteil |      |
|----------|--|-------|--------|------|
|          |  |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550    | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  | 114   | 89,8   | 26,1 |
| 9-404    | Neuropsychologische Therapie   | 54    | 42,5   | 12,4 |
| 8-390    | Lagerungsbehandlung  | 27    | 21,3   | 6,2  |
| 5-893.0d | <b>GR</b> Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Gesäß                 | 23    | 18,1   | 5,3  |
| 5-893.0g | <b>GR</b> Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Fuß                   | 22    | 17,3   | 5,0  |
| 8-121    | Darmspülung  | 12    | 9,4    | 2,7  |
| 5-893.1g | <b>GR</b> Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Großflächig: Fuß                    | 11    | 8,7    | 2,5  |
| 5-893.0e | <b>GR</b> Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie | 8     | 6,3    | 1,8  |
| 5-893.0f | <b>GR</b> Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Unterschenkel         | 8     | 6,3    | 1,8  |
| 3-220    | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  | 8     | 6,3    | 1,8  |

**Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)**

| OPS      | Fälle     | Anteil |      | VWD  | PKKS | Gruppierungsrelevante Prozedur |     |   |
|----------|-----------|--------|------|------|------|--------------------------------|-----|---|
|          |           | Fälle  | kum. |      |      |                                |     |   |
| 5-893.0d | <b>GR</b> | 23     | 18,1 | 49,9 | 30,6 | 26,6                           | 3,9 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Gesäß              |
| 5-893.0g | <b>GR</b> | 22     | 17,3 | 54,9 | 28,2 | 26,6                           | 3,9 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Fuß                |
| 5-893.1g | <b>GR</b> | 11     | 8,7  | 60,2 | 32,6 | 30,4                           | 3,4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Großflächig: Fuß                 |
| 5-893.0e | <b>GR</b> | 8      | 6,3  | 62,0 | 31,8 | 29,9                           | 3,8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Oberschenkel und   |
| 5-893.0f | <b>GR</b> | 8      | 6,3  | 63,8 | 28,6 | 27,7                           | 3,6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Unterschenkel      |
| 5-893.1e | <b>GR</b> | 6      | 4,7  | 67,0 | 28,3 | 26,0                           | 3,7 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Großflächig: Oberschenkel und    |
| 5-893.1f | <b>GR</b> | 5      | 3,9  | 73,7 | 22,8 | 17,0                           | 3,4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Großflächig: Unterschenkel       |
| 5-893.1d | <b>GR</b> | 5      | 3,9  | 74,8 | 39,4 | 35,8                           | 4,0 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Großflächig: Gesäß               |
| 5-893.0x | <b>GR</b> | 5      | 3,9  | 76,0 | 23,0 | 22,9                           | 3,4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Sonstige           |
| 5-893.07 | <b>GR</b> | 4      | 3,1  | 79,2 | 29,0 | 24,0                           | 3,3 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Oberarm und Ellenb |
| 5-893.0b | <b>GR</b> | 4      | 3,1  | 81,0 | 39,5 | 38,5                           | 4,0 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Bauchregion        |
| 5-893.08 | <b>GR</b> | 3      | 2,4  | 84,7 | 11,3 | 11,0                           | 4,0 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement]: Kleinflächig: Unterarm           |



# I62A Frakturen an Becken und Schenkelhals mit äußerst schweren CC

Kliniken mit n>9 / ges.: 14 / 17 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 436 95,2% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 458 Fälle m. Prozeduren: 230 50,2%

|                      |                         |                   |                   |                            |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Katalog* Projekt     | Anzahl Anteil           | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*: 2,132        | Standardfallerlös* 6.166 € |
| VWD geo: 14,9 21,6   | low outlier: 9 2,0%     | 4                 | Abschlag*: 0,372  | Abschlag / Tag*: 1.076 €   |
| VWD arith: 20,1 23,9 | inlier: 345 75,3%       |                   | Zuschlag*: 0,075  | Zuschlag / Tag*: 217 €     |
|                      | high outlier: 104 22,7% | 30                | Verlegung*: 0,117 | Verlegung / Tag*: 338 €    |

| Verlegungsfälle | N   | Anteil | VD      | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. | Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle | Anteil | ari.VDgeo.VD |
|-----------------|-----|--------|---------|------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|--------------|
| Gesamt:         | 436 | 95,2%  |         | 0    |       |        | M       | 100   | 21,8%  | <11 Jahre: |       |        |              |
| Abschlag:       | 69  | 15,8%  | 1 - 14  | 1    |       |        | W       | 358   | 78,2%  | 11-30 Jahr |       |        |              |
| Pauschale:      | 268 | 61,5%  | 15 - 29 | 2    |       |        |         |       |        | 31-50 Jahr | 1     | 0,2%   | 23,0 23,0    |
| Zuschlag:       | 99  | 22,7%  | ab 30   | 3    |       |        |         |       |        | 51-65 Jahr | 17    | 3,7%   | 20,2 17,2    |
|                 |     |        |         | 4    | 458   | 100,0% |         |       |        | 66-70 Jahr | 14    | 3,1%   | 26,4 25,3    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 71-75 Jahr | 39    | 8,5%   | 25,2 22,3    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 76-80 Jahr | 78    | 17,0%  | 24,1 20,9    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | 81-90 Jahr | 237   | 51,7%  | 24,0 21,9    |
|                 |     |        |         |      |       |        |         |       |        | >90 Jahre: | 72    | 15,7%  | 23,2 21,4    |

## Hauptdiagnose (Top 12)

| ICD    | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose                                    |
|--------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|--|
| S72.10 | 180   | 39,3 | 39,3        | 22,9  | 24,7       | 22,5     | 4,0        | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | 109   | 23,8 | 63,1        | 24,3  | 23,9       | 22,1     | 4,0        | Schenkelhalsfraktur: Intraartikulär [medial]     |
| S72.00 | 53    | 11,6 | 74,7        | 13,1  | 21,8       | 18,9     | 4,0        | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.2  | 24    | 5,2  | 79,9        | 5,6   | 24,4       | 21,9     | 4,0        | Subtrochantäre Fraktur                           |
| S72.04 | 21    | 4,6  | 84,5        | 7,5   | 21,4       | 18,2     | 4,0        | Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal               |
| S72.11 | 18    | 3,9  | 88,4        | k.A.  | 25,8       | 23,4     | 4,0        | Femurfraktur: Intertrochantär                    |
| S32.4  | 10    | 2,2  | 90,6        | 7,0   | 23,4       | 21,2     | 4,0        | Fraktur des Acetabulums                          |
| S32.89 | 9     | 2,0  | 92,6        | 4,2   | 26,8       | 25,7     | 4,0        | Fraktur: Sonstige und multiple Teile des Beckens |
| S32.5  | 8     | 1,7  | 94,3        | 7,5   | 24,3       | 22,6     | 4,0        | Fraktur des Os pubis                             |
| S72.08 | 8     | 1,7  | 96,1        | 0,9   | 19,6       | 17,3     | 4,0        | Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile              |
| S72.05 | 7     | 1,5  | 97,6        | 1,4   | 26,9       | 20,5     | 4,0        | Schenkelhalsfraktur: Basis                       |
| S32.81 | 6     | 1,3  | 98,9        | 0,9   | 23,7       | 21,1     | 4,0        | Fraktur: Os ischium                              |

## Nebendiagnose (Top 12)

| ICD    | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 189   | 41,3         | 4,3 |
| N39.0  | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet                   | 158   | 34,5         | 3,6 |
| R32    | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                                  | 138   | 30,1         | 3,2 |
| I50.9  | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                 | 113   | 24,7         | 2,6 |
| I48    | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern  | 103   | 22,5         | 2,4 |
| R15    | SG Stuhlinkontinenz   | 101   | 22,1         | 2,3 |
| L89    | SG Dekubitalgeschwür  | 98    | 21,4         | 2,3 |
| F03    | SG Nicht näher bezeichnete Demenz   | 96    | 21,0         | 2,2 |
| Z96.6  | Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten                          | 94    | 20,5         | 2,2 |
| R26.8  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 91    | 19,9         | 2,1 |
| I50.0  | SG Kongestive Herzinsuffizienz  | 73    | 15,9         | 1,7 |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnetes Gefäß            | 68    | 14,8         | 1,6 |

## SG-Nebendiagnose (Top 12)

| ICD   | SG-Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | SG  |
|-------|--|-------|--------------|-----|
| N39.0 | SG Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet        | 158   | 34,5         | 7,1 |
| R32   | SG Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                       | 138   | 30,1         | 6,2 |
| I50.9 | SG Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                      | 113   | 24,7         | 5,1 |
| I48   | SG Vorhofflattern und Vorhofflimmern                             | 103   | 22,5         | 4,6 |
| R15   | SG Stuhlinkontinenz  | 101   | 22,1         | 4,6 |
| L89   | SG Dekubitalgeschwür   | 98    | 21,4         | 4,4 |
| F03   | SG Nicht näher bezeichnete Demenz                                | 96    | 21,0         | 4,3 |
| I50.0 | SG Kongestive Herzinsuffizienz                                   | 73    | 15,9         | 3,3 |
| I11.0 | SG Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | 66    | 14,4         | 3,0 |
| N39.4 | SG Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz                    | 48    | 10,5         | 2,2 |
| D50.0 | SG Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                | 47    | 10,3         | 2,1 |
| N18.8 | SG Sonstige chronische Niereninsuffizienz                        | 46    | 10,0         | 2,1 |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

[ 13.03.2003 ]

G-DRG Katalog 1.0 (Erlös simuliert)

(Fortsetzung)

**Alle Prozeduren (Top 10)**

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 230 50,2%

| OPS     | Prozedur   | Fälle | Anteil |      |
|---------|--|-------|--------|------|
|         |  |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  | 209   | 90,9   | 47,8 |
| 9-404   | Neuropsychologische Therapie   | 60    | 26,1   | 13,7 |
| 8-390   | Lagerungsbehandlung  | 31    | 13,5   | 7,1  |
| 3-200   | Native Computertomographie des Schädels  | 19    | 8,3    | 4,3  |
| 9-301   | Therapeutische Maßnahmen für Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen                                 | 17    | 7,4    | 3,9  |
| 3-220   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  | 14    | 6,1    | 3,2  |
| 1-632   | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  | 12    | 5,2    | 2,7  |
| 9-405.0 | Psychotherapie: Einzeltherapie   | 10    | 4,3    | 2,3  |
| 9-302   | Therapeutische Maßnahmen für Schluckstörungen  | 6     | 2,6    | 1,4  |
| 8-800.2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzent | 5     | 2,2    | 1,1  |

**Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)**

| OPS | Fälle | Anteil |      | VWD | PKKS | Gruppierungsrelevante Prozedur |
|-----|-------|--------|------|-----|------|--------------------------------|
|     |       | Fälle  | kum. |     |      |                                |
| GR  | 0     |        | 0,0  |     |      |                                |

**I68A Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre**

Kliniken mit n>9 / ges.: 11 / 17 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 232 73,4% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 316 Fälle m. Prozeduren: 161 50,9%

|                      |                         |                   |                   |                            |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Katalog* Projekt     | Anzahl Anteil           | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*: 1,049        | Standardfallerlös* 3.034 € |
| VWD geo: 8,5 19,2    | low outlier: 0 0,0%     | 2                 | Abschlag*: 0,342  | Abschlag / Tag*: 989 €     |
| VWD arith: 11,9 21,6 | inlier: 206 65,2%       |                   | Zuschlag*: 0,072  | Zuschlag / Tag*: 208 €     |
|                      | high outlier: 110 34,8% | 24                | Verlegung*: 0,108 | Verlegung / Tag*: 312 €    |

| Verlegungsfälle | N   | Anteil | VD     | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. | Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle | Anteil | ari.VDgeo.VD |
|-----------------|-----|--------|--------|------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|--------------|
| Gesamt:         | 232 | 73,4%  |        | 0    | 32    | 10,1%  | M       | 67    | 21,2%  | <11 Jahre: |       |        |              |
| Abschlag:       | 19  | 8,2%   | 1 - 8  | 1    | 1     | 0,3%   | W       | 249   | 78,8%  | 11-30 Jahr |       |        |              |
| Pauschale:      | 124 | 53,4%  | 9 - 23 | 2    | 61    | 19,3%  |         |       |        | 31-50 Jahr | 2     | 0,6%   | 20,0 20,0    |
| Zuschlag:       | 89  | 38,4%  | ab 24  | 3    | 134   | 42,4%  |         |       |        | 51-65 Jahr | 11    | 3,5%   | 25,5 22,3    |
|                 |     |        |        | 4    | 88    | 27,8%  |         |       |        | 66-70 Jahr | 12    | 3,8%   | 17,8 14,8    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 71-75 Jahr | 30    | 9,5%   | 26,4 23,5    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 76-80 Jahr | 76    | 24,1%  | 21,4 19,0    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 81-90 Jahr | 165   | 52,2%  | 20,8 18,6    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | >90 Jahre: | 20    | 6,3%   | 22,1 20,4    |

**Hauptdiagnose (Top 12)**

| ICD    | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose   |
|--------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|---|
| S32.00 | 43    | 13,6 | 13,6        | 6,9   | 23,9       | 21,2     | 3,0        | Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet                      |
| M54.4  | 28    | 8,9  | 22,5        | 12,1  | 20,4       | 18,3     | 2,7        | Lumboischialgie   |
| S32.01 | 25    | 7,9  | 30,4        | 4,5   | 23,2       | 20,4     | 2,8        | Fraktur eines Lendenwirbels: L1   |
| M54.5  | 23    | 7,3  | 37,7        | 6,7   | 17,8       | 15,7     | 2,7        | Kreuzschmerz  |
| S22.06 | 15    | 4,7  | 42,4        | 2,3   | 21,1       | 19,4     | 3,3        | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12                                       |
| M51.2  | 12    | 3,8  | 46,2        | 4,7   | 25,1       | 23,3     | 2,6        | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung                            |
| M47.8  | 11    | 3,5  | 49,7        | k.A.  | 21,0       | 19,3     | 2,6        | Sonstige Spondylose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                   |
| M51.1  | 10    | 3,2  | 52,8        | 12,7  | 19,3       | 15,5     | 2,7        | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie                   |
| M48.0  | 10    | 3,2  | 56,0        | 4,6   | 28,0       | 27,4     | 2,9        | Spinalstenose: Lumbalbereich  |
| S32.02 | 9     | 2,8  | 58,9        | 1,6   | 21,9       | 19,3     | 3,0        | Fraktur eines Lendenwirbels: L2   |
| S32.03 | 7     | 2,2  | 61,1        | k.A.  | 22,4       | 21,3     | 2,0        | Fraktur eines Lendenwirbels: L3   |
| T08.0  | 7     | 2,2  | 63,3        | 2,1   | 25,1       | 24,0     | 2,9        | Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet: Geschlossen oder o.n.A. |

**Nebendiagnose (Top 12)**

| ICD    | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I10    | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 133   | 42,1         | 5,5 |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnetes Gefäß            | 63    | 19,9         | 2,6 |
| R26.8  | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität | 54    | 17,1         | 2,2 |
| K59.0  | Obstipation   | 45    | 14,2         | 1,9 |
| I50.9  | <b>SG</b> Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                          | 44    | 13,9         | 1,8 |
| N39.0  | <b>SG</b> Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet            | 43    | 13,6         | 1,8 |
| I48    | <b>SG</b> Vorhofflattern und Vorhofflimmern                                 | 42    | 13,3         | 1,7 |
| I50.0  | <b>SG</b> Kongestive Herzinsuffizienz                                       | 35    | 11,1         | 1,5 |
| I11.0  | <b>SG</b> Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz     | 34    | 10,8         | 1,4 |
| M81.0  | Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen                         | 31    | 9,8          | 1,3 |
| H91.1  | Presbyakusis  | 31    | 9,8          | 1,3 |
| R32    | <b>SG</b> Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                           | 31    | 9,8          | 1,3 |

**SG-Nebendiagnose (Top 12)**

| ICD    | SG-Nebendiagnose  | Fälle | Anteil Fälle | SG  |
|--------|---|-------|--------------|-----|
| I50.9  | <b>SG</b> Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                        | 44    | 13,9         | 5,6 |
| N39.0  | <b>SG</b> Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet          | 43    | 13,6         | 5,5 |
| I48    | <b>SG</b> Vorhofflattern und Vorhofflimmern                               | 42    | 13,3         | 5,4 |
| I50.0  | <b>SG</b> Kongestive Herzinsuffizienz                                     | 35    | 11,1         | 4,5 |
| I11.0  | <b>SG</b> Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz   | 34    | 10,8         | 4,4 |
| R32    | <b>SG</b> Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                         | 31    | 9,8          | 4,0 |
| F03    | <b>SG</b> Nicht näher bezeichnete Demenz                                  | 27    | 8,5          | 3,5 |
| I50.1  | <b>SG</b> Linksherzinsuffizienz   | 19    | 6,0          | 2,4 |
| J44.9  | <b>SG</b> Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet | 17    | 5,4          | 2,2 |
| N18.90 | <b>SG</b> Chronische Niereninsuffizienz, nicht näher bezeichnet           | 16    | 5,1          | 2,1 |
| G20    | <b>SG</b> Primäres Parkinson-Syndrom                                      | 14    | 4,4          | 1,8 |
| R15    | <b>SG</b> Stuhlinkontinenz  | 14    | 4,4          | 1,8 |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

[ 13.03.2003 ]

G-DRG Katalog 1.0 (Erlös simuliert)

**I68A Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre**

(Fortsetzung)

**Alle Prozeduren (Top 10)**

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 161 50,9%

| OPS     | Prozedur  | Fälle | Anteil |      |
|---------|---|-------|--------|------|
|         |   |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung         | 142   | 88,2   | 48,3 |
| 9-404   | Neuropsychologische Therapie                              | 49    | 30,4   | 16,7 |
| 8-390   | Lagerungsbehandlung                                       | 10    | 6,2    | 3,4  |
| 1-632   | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie                 | 9     | 5,6    | 3,1  |
| 3-200   | Native Computertomographie des Schädels                   | 9     | 5,6    | 3,1  |
| 3-203   | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark | 7     | 4,3    | 2,4  |
| 9-405.0 | Psychotherapie: Einzeltherapie                            | 7     | 4,3    | 2,4  |
| 3-220   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel       | 5     | 3,1    | 1,7  |
| 9-405.3 | Psychotherapie: Krisenintervention                        | 4     | 2,5    | 1,4  |
| 8-121   | Darmspülung   | 3     | 1,9    | 1,0  |

**Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)**

| OPS | Fälle | Anteil |      | VWD | PKKS | Gruppierungsrelevante Prozedur |
|-----|-------|--------|------|-----|------|--------------------------------|
|     |       | Fälle  | kum. |     |      |                                |
| GR  | 0     |        | 0,0  |     |      |                                |

# 175A Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC

Kliniken mit n>9 / ges.: 9 / 16 (BAG KGE) Verlegungsfälle: 305 92,7% Simulierter BFP: 2.892 €  
 Fälle gesamt: 329 Fälle m. Prozeduren: 168 51,1%

|            |           |               |           |                   |             |       |                    |         |
|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-------|--------------------|---------|
| Katalog*   | Projekt   | Anzahl        | Anteil    | 1. Tag mit Ab/Zu* | RG*:        | 1,179 | Standardfallerlös* | 3.410 € |
| VWD geo:   | 9,4 21,1  | low outlier:  | 1 0,3%    | 2                 | Abschlag*:  | 0,369 | Abschlag / Tag*:   | 1.067 € |
| VWD arith: | 13,2 23,8 | inlier:       | 183 55,6% |                   | Zuschlag*:  | 0,071 | Zuschlag / Tag*:   | 205 €   |
|            |           | high outlier: | 145 44,1% | 24                | Verlegung*: | 0,106 | Verlegung / Tag*:  | 307 €   |

| Verlegungsfälle | N   | Anteil | VD     | PKKS | Fälle | Anteil | Geschl. | Fälle | Anteil | Altersgrp. | Fälle | Anteil | ari.VDgeo.VD |
|-----------------|-----|--------|--------|------|-------|--------|---------|-------|--------|------------|-------|--------|--------------|
| Gesamt:         | 305 | 92,7%  |        | 0    |       |        | M       | 45    | 13,7%  | <11 Jahre: |       |        |              |
| Abschlag:       | 21  | 6,9%   | 1 - 8  | 1    |       |        | W       | 283   | 86,0%  | 11-30 Jahr |       |        |              |
| Pauschale:      | 142 | 46,6%  | 9 - 23 | 2    | 65    | 19,8%  |         |       |        | 31-50 Jahr |       |        |              |
| Zuschlag:       | 142 | 46,6%  | ab 24  | 3    | 120   | 36,5%  |         |       |        | 51-65 Jahr | 4     | 1,2%   | 24,3 21,9    |
|                 |     |        |        | 4    | 144   | 43,8%  |         |       |        | 66-70 Jahr | 21    | 6,4%   | 25,7 20,1    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 71-75 Jahr | 41    | 12,5%  | 22,8 19,6    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 76-80 Jahr | 65    | 19,8%  | 22,7 20,7    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | 81-90 Jahr | 158   | 48,0%  | 24,0 21,6    |
|                 |     |        |        |      |       |        |         |       |        | >90 Jahre: | 40    | 12,2%  | 25,0 21,6    |

## Hauptdiagnose (Top 12)

| ICD    | Fälle | %    | Anteil kum. | Kat.* | VWD arith. | VWD geo. | PKKS arith | Hauptdiagnose   |
|--------|-------|------|-------------|-------|------------|----------|------------|---|
| S42.21 | 60    | 18,2 | 18,2        | 16,5  | 21,8       | 19,8     | 3,3        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf                        |
| S42.20 | 52    | 15,8 | 34,0        | 11,4  | 22,5       | 19,9     | 3,1        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet |
| S82.18 | 26    | 7,9  | 41,9        | 6,5   | 30,9       | 27,3     | 3,5        | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige                      |
| S42.3  | 23    | 7,0  | 48,9        | 5,2   | 22,6       | 18,7     | 3,5        | Fraktur des Humerusschaftes   |
| S82.81 | 21    | 6,4  | 55,3        | 2,4   | 21,9       | 19,8     | 3,3        | Bimalleolarfraktur  |
| S82.0  | 15    | 4,6  | 59,9        | 4,1   | 25,5       | 23,9     | 2,8        | Fraktur der Patella   |
| S82.6  | 12    | 3,6  | 63,5        | 8,2   | 24,0       | 23,2     | 3,1        | Fraktur des Außenknöchels   |
| S42.22 | 12    | 3,6  | 67,2        | 4,1   | 22,3       | 21,6     | 3,6        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum          |
| S42.29 | 9     | 2,7  | 69,9        | 1,7   | 25,2       | 23,6     | 3,0        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S82.82 | 9     | 2,7  | 72,6        | k.A.  | 30,4       | 28,9     | 3,0        | Trimalleolarfraktur   |
| S42.41 | 7     | 2,1  | 74,8        | k.A.  | 21,3       | 17,2     | 3,6        | Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär                 |
| S42.23 | 6     | 1,8  | 76,6        | 1,7   | 28,5       | 23,7     | 3,2        | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum           |

## Nebendiagnose (Top 12)

| ICD      | Nebendiagnose   | Fälle | Anteil Fälle | ICD |
|----------|---|-------|--------------|-----|
| I10      | Essentielle (primäre) Hypertonie  | 145   | 44,1         | 6,3 |
| R26.8    | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität                               | 64    | 19,5         | 2,8 |
| I50.9 SG | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet  | 54    | 16,4         | 2,3 |
| H91.1    | Presbyakusis  | 45    | 13,7         | 1,9 |
| I11.0 SG | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz   | 41    | 12,5         | 1,8 |
| I48 SG   | Vorhofflattern und Vorhofflimmern   | 41    | 12,5         | 1,8 |
| I50.0 SG | Kongestive Herzinsuffizienz   | 39    | 11,9         | 1,7 |
| E11.90   | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-II-Diabetes] ohne Komplikationen: Nicht als entglei | 38    | 11,6         | 1,6 |
| N39.0 SG | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet  | 38    | 11,6         | 1,6 |
| F03 SG   | Nicht näher bezeichnete Demenz  | 37    | 11,2         | 1,6 |
| R32 SG   | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz   | 35    | 10,6         | 1,5 |
| I25.10   | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnetes Gefäß  | 33    | 10,0         | 1,4 |

## SG-Nebendiagnose (Top 12)

| ICD      | SG-Nebendiagnose  | Fälle | Anteil Fälle | SG  |
|----------|---|-------|--------------|-----|
| I50.9 SG | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                      | 54    | 16,4         | 6,2 |
| I11.0 SG | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | 41    | 12,5         | 4,7 |
| I48 SG   | Vorhofflattern und Vorhofflimmern                             | 41    | 12,5         | 4,7 |
| I50.0 SG | Kongestive Herzinsuffizienz                                   | 39    | 11,9         | 4,4 |
| N39.0 SG | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet        | 38    | 11,6         | 4,3 |
| F03 SG   | Nicht näher bezeichnete Demenz                                | 37    | 11,2         | 4,2 |
| R32 SG   | Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz                       | 35    | 10,6         | 4,0 |
| N18.8 SG | Sonstige chronische Niereninsuffizienz                        | 19    | 5,8          | 2,2 |
| N39.4 SG | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz                    | 17    | 5,2          | 1,9 |
| I50.1 SG | Linksherzinsuffizienz   | 17    | 5,2          | 1,9 |
| L89 SG   | Dekubitalgeschwür   | 17    | 5,2          | 1,9 |
| D50.0 SG | Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                | 16    | 4,9          | 1,8 |

\* = Informationen aus Fallpauschalen-Katalog

[ 13.03.2003 ]

G-DRG Katalog 1.0 (Erlös simuliert)

**I75A Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC**

(Fortsetzung)

**Alle Prozeduren (Top 10)**

Anteile bezogen auf Fälle mit Prozeduren: N = 168 51,1%

| OPS     | Prozedur   | Fälle | Anteil |      |
|---------|--|-------|--------|------|
|         |  |       | Fälle  | OPS  |
| 8-550   | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung  | 159   | 94,6   | 62,8 |
| 9-404   | Neuropsychologische Therapie   | 38    | 22,6   | 15,0 |
| 8-390   | Lagerungsbehandlung  | 10    | 6,0    | 4,0  |
| 3-220   | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel  | 7     | 4,2    | 2,8  |
| 3-200   | Native Computertomographie des Schädels  | 5     | 3,0    | 2,0  |
| 9-405.0 | Psychotherapie: Einzeltherapie   | 5     | 3,0    | 2,0  |
| 8-121   | Darmspülung  | 4     | 2,4    | 1,6  |
| 1-632   | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie  | 4     | 2,4    | 1,6  |
| 8-800.2 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzent | 2     | 1,2    | 0,8  |
| 9-302   | Therapeutische Maßnahmen für Schluckstörungen  | 2     | 1,2    | 0,8  |

**Gruppierungsrelevante Prozeduren (Top 12)**

| OPS | Fälle | Anteil |      | VWD | PKKS | Gruppierungsrelevante Prozedur |
|-----|-------|--------|------|-----|------|--------------------------------|
|     |       | Fälle  | kum. |     |      |                                |
| GR  | 0     |        | 0,0  |     |      |                                |